

Impotencia sexual Organica.

Veja estas dicas , Impotência orgânica esta associada a algum distúrbio orgânico no paciente e tem como característica principal o fato de possuir início gradual que vai piorando lentamente, se tornando cada vez mais frequente. As formas mais comuns de impotência orgânica são: a. Dificuldade para alcançar a ereção: Frequentemente ligada a dificuldade de transmissão nervosa das mensagens químicas que desencadeiam a ereção, estando presente também nas insuficiências hormonais, esclerose múltipla, doença de Parkinson, lesões de coluna, cirurgias pélvicas radicais, neuropatia diabética com comprometimento da inervação pudenda. Além disso, temos como causas importantes de impotência orgânica o uso de drogas, álcool em excesso, e tabagismo (fumo) , que trazem danos ao sistema circulatório com consequentes danos a qualidade da ereção. Alguns medicamentos como os antihipertensivos, os medicamentos utilizados para tratamento de úlceras do aparelho digestivo, diuréticos e outros podem em algumas situações interferir drasticamente com o mecanismo de ereção. Os medicamentos mais comumente responsáveis por distúrbios relacionados a impotência são: * Estrogênio: para homens com câncer de próstata .

* Antiandrogênicos (flutamida): para homens com câncer de próstata .

* Lupron: remédio para tratamento do câncer de próstata.

* Proscar: para homens com hipertrofia prostática, pode diminuir o volume ejaculatório.

* Diuréticos: para tratamento de doenças cardíacas e hipertensão.

* Metildopa: para tratamento de hipertensão.

* Beta bloqueadores: para tratamento de doenças cardíacas e hipertensão.

* Bloqueadores do Canal de Cálcio: tratamento da hipertensão.

* Tranquilizantes.

* Decongestionantes.

* Anti convulsivantes.

* Cimetidina: tratamento de úlceras gástricas.

* Digoxina : para tratamento de doenças cardíacas.. b. Dificuldade de obter uma ereção com rigidez, também associada com a oclusão do sistema venoso, arteriosclerose, hipertensão, diabetes, fluxo arterial diminuído, etc. c. Dificuldade para manter uma ereção, geralmente associada com traumas pélvicos, hipertensão, diabete, infarto prévio, e etc, que geram uma incapacidade no sistema venoso de cumprir sua função oclusiva e reter o sangue nos corpos cavernosos. Estima-se que 50-60% dos homens diabéticos sofram com a impotência. Também existem alguns medicamentos como o [viagra](#) que pode ajudar muito na solução deste problema.

Sobre o Autor

Levando a informação a todos .

Source: <http://www.artigopt.com>